

La direction de la Santé Publique

Affaire suivie par :

Dr Bruno MOREL

bruno.morel@ars.sante.fr

A l'attention des professionnels de santé
de la Savoie, de la Haute-Savoie, de
l'Isère, de la Loire et du Rhône.

Lyon, le 6 décembre 2024

Objet : situation de cas groupés de primo-infections à VIH en lien avec une même source de contamination

Chères consœurs, chers confrères,

Nous constatons depuis début 2024 dans plusieurs départements de la région une circulation inhabituelle de VIH.

14 cas sont identifiés depuis avril 2024. Ils sont répartis dans les départements suivants : Savoie (8), Isère (1), Rhône (4) et Haute- Savoie (1).

La plupart des patients ont été diagnostiqués au stade de primo infection symptomatique. Tous les cas sont infectés par un virus identique au génotypage. Ces éléments font évoquer une source commune et une contamination récente. Pour un certain nombre de cas, le mode de transmission semble être un rapport sexuel tarifé, sans utilisation du préservatif. Un lien épidémiologique commun, avéré à l'interrogatoire, a été identifié, aux alentours d'Aix-les-Bains, pour 6 des 8 cas de Savoie.

Dans ce contexte, il est important de :


- Dépister largement et sensibiliser les patients à l'utilisation du préservatif.**
Santé publique France a lancé une campagne nationale de sensibilisation (spots TV, réseaux sociaux, etc.) dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida du 1^{er} décembre. En accord avec l'ARS, cette campagne sera intensifiée dans la région entre le 9 et le 15 décembre. Sur leur site, vous pouvez [télécharger une affiche sur le dépistage VIH](#) ainsi que [d'autres supports via ce lien](#).
- Avoir bien en tête les **signes cliniques de primo-infection** :
 - **40 % des primo infection sont asymptomatiques**
 - 2 à 6 semaines après la contamination
 - **Signes cliniques peu spécifiques :**
 - Syndrome pseudo-grippal : fièvre, myalgies, céphalées
 - Éruption cutanée
 - Ulcérations génitales
 - Pharyngite, ulcérations buccales
 - Poly adénopathie
 - Signes neurologiques (paralysie faciale...)
 - **Signes biologiques :**
 - Leuco neutropénie
 - Lymphopénie
 - Thrombopénie
 - Cytolyse hépatique

3. Connaître la cinétique des marqueurs de l'infection à VIH.

- Les tests rapides d'orientation diagnostique TROD peuvent être faussement négatifs en cas d'infection récente.
- **Les tests ELISA de 4^e génération, utilisés actuellement en France sont très sensibles. Associés à la protéine p24 ils permettent de réduire la fenêtre sérologique à une quinzaine de jours.**

Le dépistage repose donc sur la recherche d'Ac anti VIH-1 et VIH-2 et Ag p24 par un test combiné.

- Les séroconversions survenant plus de 6 semaines après l'exposition sont exceptionnelles (<1%).



© C. Delaugerre, F. Simon, 2012

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes travaille depuis plus d'un mois avec **les associations locales**, spécialisées dans la prévention et la santé sexuelle, particulièrement actives sur le terrain, afin de sensibiliser la population (opérations d'aller-vers, dépistages, etc.).

D'autres actions de communication sont mises en œuvre pour rappeler les messages de prévention afin d'éviter toute transmission du VIH (campagne d'information digitale notamment).

Un communiqué de presse sur cette situation est en cours de diffusion.

Nous vous tiendrons bien-sûr informés de l'évolution de la situation.

Pour la directrice générale,
et par délégation,
Dr Bruno MOREL
Directeur délégué veille et alertes sanitaires