

# Vaccination COVID-19 aux centres de vaccination du CHU de Saint-Etienne

## Guide pratique à l'intention des médecins et intervenants

Les indications vaccinales pour la COVID-19 changent fréquemment, ce guide est à jour à la date du **1.06.2021**. Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter <https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/> ou bien [https://www.mesvaccins.net/web/diseases/57-covid-19#maladie\\_les-recommandations-vaccinales](https://www.mesvaccins.net/web/diseases/57-covid-19#maladie_les-recommandations-vaccinales).

### 1. RECOMMANDATIONS VACCINALES

TOUS les adultes  $\geq 18$  ans sont à présent éligibles à la vaccination en tenant compte du fait que la vaccination Astra Zeneca et Janssen est recommandée chez les  $\geq 55$  ans.

\* Liste et modalités sur [solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19](https://solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19)

 <b>La vaccination POUR LE GRAND PUBLIC</b>		 Mon âge	 Ma situation	 Janssen ou AstraZeneca	 Moderna	 Pfizer-BioNTech
<b>0 à 15 ans inclus</b>				→ Pour l'instant, je ne peux pas me faire vacciner		
<b>16 à 17 ans inclus</b>	Je n'ai pas de problème de santé → J'ai une pathologie à très haut risque de forme grave de COVID-19* →			→ Pour l'instant, je ne peux pas me faire vacciner		
<b>18 à 54 ans inclus</b>	Quelle que soit ma situation →				✓ • Mon lieu de soin • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail • Pharmacie • Centre de vaccination (2 <sup>ème</sup> dose uniquement)	✓ • Centre de vaccination • Mon lieu de soin
<b>55 ans et plus</b>	Quelle que soit ma situation →			✓ • Mon lieu de soin • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail • Pharmacie • Cabinet infirmier ou sage-femme • A domicile	✓ • Mon lieu de soin • Médecin traitant (généraliste ou spécialiste) • Médecin du travail • Pharmacie • Centre de vaccination (2 <sup>ème</sup> dose uniquement)	✓ • Centre de vaccination • Mon lieu de soin

**N.B. :**

- Les personnes (de 16 ans et plus) ayant déjà eu la Covid-19 ne reçoivent qu'une seule injection, sur la base d'un justificatif (test PCR ou test antigénique ou résultat de sérologie positif de plus de 3 mois).
- La vaccination des femmes enceintes est recommandée à partir du 2<sup>e</sup> trimestre.
- Les proches (de 16 ans et plus) d'une personne sévèrement immunodéprimée (résidant au même domicile ou apportant une aide quotidienne) sont éligibles à la vaccination, sur la base d'un certificat médical du médecin traitant de la personne immunodéprimée et selon les modalités d'administration des différents vaccins.

**Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur :**  
[www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19](https://www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19)

version : lundi 21 mai 2021

Pour rappel SEULE l'allergie à un composant du vaccin est une contre-indication à la vaccination

Pour les sujets de < 55 ans ayant reçu une dose de vaccin Astra Zeneca, l'HAS s'est prononcé le 9.04.21 ([https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3260335/fr/covid-19-quelle-strategie-vaccinale-pour-les-moins-de-55-ans-ayant-deja-recu-une-dose-d-astrazeneca](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3260335/fr/covid-19-quelle-strategie-vaccinale-pour-les-moins-de-55-ans-ayant-deja-recu-une-dose-d-astrazeneca)). La HAS **recommande d'utiliser une dose d'un des vaccins à ARNm actuellement disponibles** (COMIRNATY® ou vaccin Covid-19 Moderna) en remplacement de l'administration de la deuxième dose chez les personnes de moins de 55 ans ayant reçu une première dose du vaccin Astra Zeneca. Elle recommande de s'assurer de l'accord des patients pour cette deuxième dose. **De plus, elle préconise de faire cette vaccination avec un intervalle de 12 semaines entre les doses.**

## 2. ALLERGIE

Tous les vaccins COVID-19 contiennent du Polyéthylène glycol (PEG) ou des dérivés ou du polysorbate. En cas d'allergie médicamenteuse, **regarder les excipients sur le Vidal®**. **Attention** si doute sur une allergie au **macrogol** (dérivé du PEG) ou du polysorbate, décaler la vaccination et avis Allergologue (celui du patient ou bien Dr CUQ). **En cas de doute après avoir suivi ce document allo Dr CUQ 429522 (Si doute appeler le Dr CUQ, service allergologie CHU 0477829522)**. Pour autant les allergies graves en dehors des excipients des vaccins ne sont pas des contre-indications à la vaccination. Ci-dessous un tableau de la société française d'Allergologie résume le temps de surveillance suite à la vaccination.

Manifestations allergiques	Conseil pour la vaccination	Durée de surveillance après vaccination	Conduite à tenir spéciale
Antécédent d'allergie à un des composants du vaccin, en particulier aux polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée au polysorbate	Contre-indiquée	Non vacciné	Adresser en allergologie
Antécédent de réaction immédiate *, ** à une première injection d'un vaccin ARNm COVID 19	Contre-indiquée	Non vacciné	Adresser en allergologie
Antécédent de réaction immédiate *, ** à un autre vaccin non COVID ou à un médicament injectable	Surseoir	Vacciné après avis d'expert	Adresser en allergologie
Réactions retardées médicamenteuses, toxidermies même graves (DRESS, syndrome de Lyell ou de Stevens Johnson)	Vaccination normale	15 mn	
<b>Allergie à un médicament oral</b>			
Urticaire, angioedème	Vaccination normale	15 mn	
Anaphylaxie	Vaccination normale	30 mn	
Réactions retardées, toxidermies même graves (DRESS, syndrome de Lyell ou de Stevens Johnson)	Vaccination normale	15 mn	
Antécédents familiaux allergiques, y compris d'anaphylaxie	Vaccination normale	15 mn	
Rhinite, conjonctivite, asthme allergique aux pneumallergènes	Vaccination normale	15 mn	
Eczéma de contact, urticaire ou angioedème chronique, angioedème bradykinique Mastocytose sans antécédent de réaction anaphylactique	Vaccination normale	15 mn	
<b>Allergie au latex</b>			
Urticaire, angioedème, eczéma	Vaccination normale	15 mn	
Anaphylaxie	Vaccination normale	30 mn	
<b>Allergie aux venins d'hyménoptères</b>			
Urticaire, réaction au site d'injection	Vaccination normale	15 mn	
Anaphylaxie	Vaccination normale	30 mn	
<b>Allergie alimentaire</b>			
Non grave, syndrome oral, urticaire, eczéma	Vaccination normale	15 mn	
Anaphylaxie	Vaccination normale	30 mn	

\* Bronchospasme, urticaire généralisé, anaphylaxie

\*\* Hors réaction locale qui autorise la vaccination normale avec 15 min de surveillance

En annexe 2 la CAT en cas de choc anaphylactique

## 3. VACCINATION CHEZ LES PERSONNES AYANT DEJA FAIT UN COVID-19

### 3.1 COVID avant la 1ere dose :

Comme recommandé par la HAS ([https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3237271/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-vaccination-des-personnes-ayant-un-antecedent-de-covid-19](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237271/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-vaccination-des-personnes-ayant-un-antecedent-de-covid-19)) il est proposé qu'une seule dose de vaccin soit administrée aux personnes immunocompétentes ayant fait une infection par le SARS-CoV-2, quelle qu'en soit son antériorité. Après un COVID-19 prouvé (symptomatique ou non), Il est donc recommandé

de réaliser la vaccination au-delà de ce délai de 3 mois après l'infection, de préférence avec **un délai proche de 6 mois**.

**Bien penser à cocher sur le certificat de vaccination que la personne a fini son schéma vaccinal après 1 dose**

### 3.2 COVID après la 1ere dose :

Les personnes présentant un COVID avérée (PCR positive) et n'ayant pas encore reçu la 2nde dose ne doivent pas recevoir cette 2nde dose dans les délais habituels, mais **dans un délai de 6 mois et pas avant 3 mois après l'infection**.

## 4. GROSSESSE ET ALLAITEMENT

La grossesse et l'allaitement ne sont pas des contre-indications à la vaccination COVID-19.

Il est recommandé depuis le 3.04 ([https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs\\_urgent\\_39\\_rappel\\_cibles\\_vaccinales-2.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_39_rappel_cibles_vaccinales-2.pdf)) de vacciner les femmes enceintes à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre en centre de vaccination (vaccin ARNm).

Pour l'allaitement un vaccin ARNm ou vecteur viral peut être utilisé.

<http://www.cngof.fr/patientes/presse/740-covid-19-vaccination-femmes-enceintes-3ars-2021>

[https://lecrat.fr/spip.php?page=article&id\\_article=1123](https://lecrat.fr/spip.php?page=article&id_article=1123)

## 5. IMMUNODEPRIMES

-On rappelle qu'il est fortement recommandé à l'entourage proche des patients immunodéprimés de se faire vacciner. Les proches (de plus de 16 ans) d'une personne sévèrement immunodéprimée (résidant au même domicile ou apportant une aide quotidienne) sont donc éligibles à la vaccination, sur la base d'un certificat médical du médecin traitant de la personne immunodéprimée. Les personnes de moins de 55 ans doivent être vaccinées avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna ; celles de plus de 55 ans peuvent être vaccinées avec les quatre vaccins disponibles.

-Pour les personnes immunodéprimés conformément à l'avis du 6 avril 2021 du Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale (COSV) ([https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis\\_du\\_cosv\\_6\\_avril\\_2021pdf.pdf](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_6_avril_2021pdf.pdf)) et à sa mise à jour du 22 avril 2021, l'injection d'une troisième dose de vaccin est recommandée pour les personnes sévèrement immunodéprimées.

Il s'agit des personnes :

- ayant reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- sous chimiothérapie lymphopénisante ;
- traitées par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
- dialysées chroniques après avis de leur médecin traitant qui décidera de la nécessité des examens adaptés : NB pas forcément recommandé par la société de dialyse
- au cas par cas, les personnes sous immunosuppresseurs ne relevant pas des catégories susmentionnées ou porteuses d'un déficit immunitaire primitif.

Cette 3<sup>ème</sup> dose sera à espacer de 4 semaines après la 2<sup>ème</sup> injection ou à faire dès que possible si la 2<sup>ème</sup> dose remonte à > 4 semaines.

**ATTENTION les patients VIH avec lymphocytes CD4 > 200 ne SONT PAS dans cette catégorie.**

**Par ailleurs pour la 3<sup>ème</sup> dose, le spécialiste qui suit les patients potentiellement éligibles leur dira si ils ont besoin ou non d'une 3<sup>ème</sup> dose. Les indications de 3<sup>ème</sup> dose restent restreintes.**

## Conduite à tenir en cas de réaction allergique post-vaccination

Applicable par :	Date d'application :	Référence :	Version :	Nombre total
Tous les services de soins	06/01/2021	I.PLN.urg04	1	de page(s) : 2

